

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 11-3-67 622740

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE-  
FRANCHE-COMTÉ (Tél. 5-17)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, route de Seurre - BEAUNE.  
C. C. P. : DIJON 3.405-19

ABONNEMENT ANNUEL

25 Francs

Supplément n° 2 au Bulletin n° 78 - MARS 1967

10 MARS 1967

## ARBRES FRUITIERS

### TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Dans de nombreuses zones des départements de SAONE et LOIRE, de la NIEVRE et de l'YONNE, les pommiers et les poiriers précoces arrivent aux stades critiques C à C.3 - Séparation des écailles du sommet des bourgeons et apparition des boutons floraux.

Les premières contaminations d'origine conidienne ou dues aux ascospores étant possibles il est recommandé d'effectuer un premier traitement antitavelure, de préférence en utilisant une bouillie cuprique, plus persistante.

Se reporter à la liste des produits pesticides utilisables contre les tavelures.

### RAPPEL

Anthronome du Pommier, Monilia.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

H. SOULIE

Les Ingénieurs-Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles


Imprimerie de la Station de Bourgogne-Franche-Comté  
Le Directeur-Gérant  
L. BOUYX

P176



# DEVELOPPEMENT DES ORGANES DE FRUCTIFICATION DES ARBRES FRUITIERS

Tableau n° 1 - STADES-REPERES DU POIRIER



7177


INRA




# DEVELOPPEMENT DES ORGANES DE FRUCTIFICATION DES ARBRES FRUITIERS

Tableau n° 2 - STADES-REPERES DU POMMIER


bourgeon proprement dit



bouton de la fleur



fleur



ovaire et fruit

